




# impfen-info.de Impfkalender 2014/2015 – Welche Impfungen sind empfohlen? Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2014

 Säuglinge und Kleinkinder  
(2 – 23 Monate)

  Kinder und Jugendliche  
(2 – 17 Jahre)

  Erwachsene  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	<u>U4</u> 3 Monate	4 Monate	<u>U6</u> 11–14 Monate	<u>U7</u> 15–23 Monate	2–4 Jahre	<u>U9</u> 5–6 Jahre	<u>J1</u> 9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A <sup>b</sup>	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N			A		ggf. N	
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N						
Pneumokokken >		G1	G2	G3	G4	N						S <sup>c</sup>
Rotaviren >	G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N					
Masern >					G1	G2	N				S <sup>d</sup>	
Mumps >					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N					
Röteln >							N					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >									♀ G1+G2 <sup>e</sup>	♀ N <sup>e</sup>		
Grippe (Influenza) >												S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1 – G4)
- S** Standardimpfung
- ♀** Impfpfehlung für Mädchen und junge Frauen

- J** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung

<sup>a</sup> die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen  
<sup>b</sup> einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis  
<sup>c</sup> einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung  
<sup>d</sup> Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz  
<sup>e</sup> je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der HPV-Impfung ab einem Alter von 13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen